

Vaarikamardikas (*Byturus tomentosus*)

Heino Lõiveke, taimekaitse osakonna vanemteadur

Mardikas on 3,5-4,5 mm pikk, hallikasmusta värvusega. Tõuk (rahvapäraselt “vaarikauss”) on helepruun või kollakas, tumeda selja ja peaga, 6-7mm. Mardikad ja tõugud talvituvad mullas samal peenral. Mullast väljunud mardikad toituvad esialgu muudel taimedel, hiljem juba vaarikatel. Munevad ühekaupa vaarika õitesse või noortele viljadele. Tõugud ehk “ussid” toituvad viljades. Täiskasvanud tõugud laskuvad mulda, kus osa neist nukkub, osa jääb tõuguna diapausi ehk puhkeolekusse kuni järgmise kevadeni. Ka nukust väljunud noormardikad talvituvad mullas.

Kahjustavad ka mardikad, millised söövad vaarika lehtedele väikesi auke, samutihavitavad nad avanevate õite tolmukaid ja emakaid. Tõugud võivad ka vilja pealt süüa, hiljem aga viljaliha südamikü ümbrusest.

Tõrje. 1. Reavahed sügisel harida, millega hävitatakse osa talvituvaid mardikaid ja tõuke.

2. Vaarikaid pritsida õiepungade moodustumisel ja vahetult enne õitsemise algust ühega järgmistest insektitsiididest: Mavrik 2F 0,3-0,4 l/ha (lubatud 2 korda, ooteaeg 30 päeva); Malasiin 1,0-1,5 l/ha (lubatud 2 korda, ooteaeg 20 päeva). Praktikas aga nii Malasiin kui 10%-line Karbofoss, mille mõlema toimeaine on malatioon, on osutunud väga nõrgaks.

Soomes kasutatakse nimetatud tähtaegadel pritsimiseks püretroidseid preparaate (Decis, Fastac, Karate), mida meil aga pole lubatud selleks otstarbeks kasutada.

Ilma taimekaitsetöötaja tunnistuseta on lubatud osta ja kasutada vastavalt lubatud otstarbeks siin mainitud insektitsiididest Decis 2.5 EC, Fastac, Karate 5 EC või Karate Zeon, Karbofos 10%, Malasiin, Mavrik 2F.